

ALGUNOS TIPOS DE FÁRMACOS UTILIZADOS EN PSIQUIATRÍA

TIPO DE FÁRMACO

Antipsicóticos:
de primera generación (típicos)
de segunda generación (atípicos)

UTILIZACIÓN

Esquizofrenia
Manía o fases maníacas
de t. bipolares, episodio
depresivo mayor con psicosis y
estados psicóticos orgánicos.

Antipsicóticos depot

Inyectables de liberación
prolongada. Se usa igual que el
resto de antipsicóticos

Estabilizadores del humor

Trastorno bipolar, manía

Antidepresivos

Depresión moderada a severa

Ansiolíticos

Ansiedad

Hipnóticos


Insomnio

Correctores

Parkinson


Efectos secundarios de antipsic.

FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS



Son medicamentos que controlan los síntomas de los trastornos esquizofrénicos y psicóticos.

- Son la más efectiva forma de tratamiento de estas enfermedades mentales.
- A veces provocan efectos secundarios que pueden ser tratados. (inquietud motriz, rigidez y sensibilidad muscular, temblores, salivación excesiva, sensibilidad al sol, estreñimiento etc).
- Requieren un uso continuo y responsable. Previenen la aparición de crisis
- Hay dos tipos: típicos o de 1ª generación y atípicos o de 2ª generación. Estos últimos, son más modernos y tienen menos efectos secundarios neurológicos y motrices.



REGLAS PARA TOMAR LA MEDICACIÓN

- Entender las prescripciones del médico-hacer preguntas.
- Regularidad en las tomas (que coincidan en las comida).
- Nunca saltarse una dosis.
- Tomar sólo las dosis prescritas por el médico.
- Si se olvida una toma, saltársela.
- Si se olvidan varias tomas, decírselo al médico.
- Utilizar señales que recuerden tomar la medicación.
- Llevar la medicación si sale fuera de casa.
- Tomar la medicación con agua o zumo.
- Tener el envase bien cerrado y mirar la caducidad.
- No beber alcohol ni tomar drogas.
- Hablar con el médico de los efectos secundarios
- No dejar de tomar la medicación aunque se encuentre bien